



آزمایشگاه کلینیکال و مولکولی دکتر نژاده

راهنمای بیمار جهت انجام آزمایش پرولاکتین

محدوده توزیع : بخش نمونه گیری

شماره سند : ۲۱-۱۲-۴۱

تاریخ تهیه سند : ۹۶/۱/۵

تاریخ آخرین ویرایش : ۹۷/۱/۲۷

پرولاکتین (Prolactin) هورمونی که از بخش هیپوفیز مغز ترشح می شود، که در طی دوران حاملگی و شیردهی افزایش می یابد . انجام این آزمایش در اختلالات هورمونی از جمله بهم خوردن نظم عادت ماهیانه در خانم ها و نیز بیماران مشکوک به تومور هیپوفیز کمک کننده است.

شرایط قبل از آزمایش پرولاکتین :

- ۱- زمان مناسب جهت نمونه گیری برای آزمایش ، صبح هنگام و حداقل ۳ ساعت بعد از بیدار شدن می باشد.
- ۲- توصیه می شود قبل از نمونه گیری از پیاده روی ، ورزش و هر نوع فعالیت بدنی اجتناب شود .
- ۳- حداقل طی ۲۴ ساعت اخیر تماس جنسی یا نزدیکی و تحریک سینه انجام نشده باشد .
- ۴- چنانچه بیمار شرایط لازم را نداشت ، لطفاً آزمایش زمان مناسب دیگری انجام شود .
- ۵- مصرف داروهایی مانند استروژن ، ضد افسردگی ، آمفتامین ، داروهای فشار خون و برخی از داروهایی که در درمان رفلاکس معده استفاده می شوند باعث افزایش و داروهایی مانند دوپامین و لوودوپا باعث کاهش پرولاکتین می شوند .

باتشکر از رعایت موارد فوق

نام و امضاء تایید کننده:

نام و امضاء تصویب کننده: